

**แอสิทโรมัยซิน
ชนิดหยอดตา
ขนาด มิลลิกรัม
[ข้อการค้า]**

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**
- แอสิทโรมัยซิน ไดไฮเดรต (azithromycin dihydrate) เป็นยาปฏิชีวนะอยู่ในกลุ่มแมคโครไลด์
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยา เช่น เยื่อตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
- 1.3 ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส**

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่**
- เคยแพ้ยานี้หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มแมคโครไลด์หรือแพ้ส่วนประกอบในยานี้
 - หากท่านกินยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนได้แก่ เออร์โกทามีน
 - หากท่านเป็นโรคตับขึ้นรุนแรง
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
- ปัญหาโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน
- ให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้ยา**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้นขนาดยานี้ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนัก ตำแหน่งที่เกิดโรคและการตอบสนองต่อการรักษา
- 3.2 หากลืมหยดยา ควรทำอะไร**
- หยดยาทันทีที่นึกได้ หยดยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ และห้ามหยดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้าหยดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอะไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล บาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยา

- 4.1 ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร**
- หยดยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - เป็นตุ่มพอง ผิวหนังบวม แดง หลุดลอก
 - ลิ้นสีซีด
 - มีไข้สูง หนาวสั่น ไอ และเจ็บคอ
 - หัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ
 - ชัก
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง

- สูญเสียการได้ยิน
 - คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง อาเจียนใน 1 ชั่วโมงหลังหยดยา
 - ถ่ายเหลวรุนแรง หรือปนเลือด อุจจาระสีดำหรือสีซีด ปัสสาวะผิดปกติ (ปริมาณและความถี่) ปัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**
- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บ้านหมุน
 - ปวดข้อ
 - ขาดตามร่างกาย
 - เป็นผื่นคัน
 - มีเสียงในหู
 - ผิวหนังไวต่อแสง
 - อ่อนเพลียผิดปกติ
 - การรับรสไม่ดี เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเดิน
 - มีฝ้าขาวในปาก คอ คันช่องคลอด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดา (อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
 - เมื่อเปิดใช้ยาเกิน 14 วัน ให้ทิ้งยา
 - เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก
- ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....**
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
2 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร