

ซีลีค็อกซิบ 200, 400 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

- ซีลีค็อกซิบ อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ประเภทออกฤทธิ์เจาะจงต่อเอนไซม์ชื่อ คอกซ์ทู (COX-2)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์
- เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลัน อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้
- เคยแพ้ยาซัลฟาหรือยาในกลุ่มเดียวกัน
- แพ้ยาในกลุ่มเดียวกันกับซีลีค็อกซิบ
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
- ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
- กำลังมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
- เป็นโรคหัวใจขาดเลือด และ/หรือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจล้มเหลว
- เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เดือนที่ 1-6 และหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เดือนที่ 7-9 เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

- การใช้ยาในระหว่างการให้นมบุตรควรเลือกว่าจะหยุดการใช้ยานี้ หรือหยุดการให้นมมารดาแก่ทารกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของยาที่มารดาต้องใช้อย่าง
- ระวังการใช้หากท่านเป็น โรคหืด**
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้า** เช่น วอร์ฟาริน แอสไพริน และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ เช่น ไดโคลฟีแนค เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันอาจทำให้มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารมีความรุนแรงมากขึ้น
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายา และ/หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพร ที่กำลังใช้อยู่มีผลกับการใช้ยาซีลีค็อกซิบหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- วิธีใช้ยา**
กินยานี้พร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างได้ การใช้ยาควรเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และขนาดยาต่อวันต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

ให้กินยาทันทีที่นึกได้แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอจนกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ง่วงงุน เชื่องซึม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบยอดอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษาแบบประคับประคอง

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากอาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือแผลทะลุ
- หากกินยานี้แล้วรู้สึกง่วงหรือมีง่วง ให้งดเว้นการขับชียานพาหนะรวมทั้งการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตมพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดเค้นหัวใจ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้
- การทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องร่วง อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาการท้องอืด
- เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ ผื่น
- อาการบวม น้ำคืดไม่บวมที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559