

**ซิโพรฟลอกซาซิน 250 มิลลิกรัม และ
500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ (ยาต้านแบคทีเรีย) มีชื่อสามัญว่า ซิโพรฟลอกซาซิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของทางเดินหายใจส่วนล่าง
- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของกระดูกและข้อ
- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และกรวยไตอักเสบ
- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของลำไส้ใหญ่ เช่น โรคบิดจากเชื้อชิกเกลลา

1.3 ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

- หมายเหตุ โรคท้องร่วงส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา ก่อนใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้ หรือแพ้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกันได้แก่ ยาในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน เช่น นอร์

ฟลอกซาซิน โอฟลอกซาซิน ลีโวฟลอกซาซิน มอกซิฟลอกซาซิน และซิตาฟลอกซาซิน

- หากท่านใช้ยา ยาที่ขานี้ดิน ร่วมด้วย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้อาจทำให้โรคอื่นรุนแรงขึ้นหากท่านมีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้

- เป็นโรคที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี เนื่องจากอาจทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายขึ้น

- เป็นโรคลมชัก หรือมีความผิดปกติทางสมอง เนื่องจากยานี้อาจกระตุ้นสมองและอาจทำให้ชักได้ง่ายขึ้น

- เป็นโรคลำไส้อักเสบบางชนิด เนื่องจากอาจทำให้โรคกำเริบและอาจทำให้เกิดท้องร่วงจากการอักเสบของลำไส้อันเนื่องมาจากยาปฏิชีวนะได้

- โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดรุนแรง เนื่องจากอาจทำให้หายใจลำบากหรือเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อกระบังลมอ่อนแรง

- เป็นโรคหัวใจหรือมีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการกำเริบซึ่งในบางกรณีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

- เป็นเบาหวาน เนื่องจากอาจทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี

- ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจได้รับอันตรายจากยานี้มากขึ้น ได้แก่

- เป็นโรคไต โดยเฉพาะหากไตเสื่อมมาก เนื่องจากยาจะตกค้างอยู่ในร่างกายเพราะขับออกได้น้อยลง หาก

จำเป็นต้องใช้ยาต้องได้รับการปรับขนาดยาอย่างเหมาะสม

- ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม ได้แก่

- เด็ก

- หญิงมีครรภ์

- สตรีให้นมบุตร

จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาซิโพรฟลอกซาซิน กับผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ

- นม ยาลดกรด วิตามินที่มีส่วนผสมของแคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม เพราะอาจทำให้การดูดซึมยาลดลง แต่อาจใช้ได้หากกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

- ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่นวอร์ฟาริน เพราะอาจทำให้เลือดออกง่าย

- ยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้นและทำให้ผิวหนังไหม้จากแสงได้ จึงไม่ควรทำงานหรือ อยู่ในที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน และควรป้องกันตัวเองจากแสงแดด

- ยานี้อาจทำให้ปลายประสาทอักเสบ

- ยานี้มีผลข้างเคียงต่อการทำงานของระบบประสาท อาจทำให้การตอบสนองช้าลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการทำงานกับเครื่องจักรได้ ดังนั้นระหว่างใช้ยานี้หากมีผลข้างเคียงดังกล่าว ไม่ควรขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ควรกินยาตอนท้องว่าง คือ ก่อนอาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหารหรือหลังดื่มนมอย่างน้อยสองชั่วโมง
- ควรกินยาตรงเวลา ให้ระยะห่างของการกินยาแต่ละมื้อเท่ากัน ทุก 12 ชั่วโมง จะทำให้ระดับยาในเลือดและปัสสาวะคงที่และช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น
- กินยาให้ครบตามระยะเวลาการรักษา หรือตามที่แพทย์สั่งจนหมด แม้จะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะถ้าท่านหยุดยาก่อนอาจทำให้การฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์และอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาได้
- ขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา สำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โรคติดเชื้อที่เป็น ให้ใช้ตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับมื้อถัดไป ให้เว้นยาในมื้อนั้น แล้วรอกินยาของมื้อต่อไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชัก หัวใจเต้นเร็ว ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา ได้แก่ ผื่นคัน ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก หน้ามีดเป็นลม แน่นหน้าอก หายใจหรือกลืนลำบาก ผื่นแดง ผิวไหมหรือตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- ชัก
- เส้นเอ็นบริเวณไหล่ มือ หรือข้อเท้ามีอาการปวด บวม โดยไม่ทราบสาเหตุ
- ผิวหนังอักเสบหลังถูกแสงแดด
- มีอาการปวด แสบร้อน รู้สึกเหมือนมีเข็มตำ ขา และการอ่อนแรงของแขนขา ตลอดจนการรับรู้ความรู้สึกสัมผัส ความเจ็บปวด อุณหภูมิหรือการทรงตัวของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ง่วงนอน เหนื่อยขาดิผิดปกติ
- ปวดศีรษะ เวียนหัว ง่วงนอน หรือนอนไม่หลับ
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ไม่สบายท้อง ท้องเสีย หรือท้องผูก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา หรือเก็บยานี้ในซองที่ปิดสนิทและไม่ให้ยาโดนแสงโดยตรง
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
2 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร