

เอทอริคอกสิบ 30, 60, 90, 120 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าเอทอริคอกสิบ (etoricoxib) อยู่ใน
กลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ประเภทออก
ฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเอนไซม์ชื่อ COX-2

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ กระดูกสันหลังอักเสบข้อยึดติด
ข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเกาต์
- บรรเทาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
- บรรเทาอาการปวดจากการผ่าตัดช่องปากหรือทำฟัน

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือเคยแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับยานี้
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยา
แอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
รวมถึงยาอื่นๆ ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเอนไซม์ชื่อ
COX-2
- มีแผลของทางเดินอาหาร หรือมีเลือดออกในทางเดิน
อาหาร มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่องอย่าง
รุนแรง มีภาวะความดันเลือดสูง มีภาวะหัวใจล้มเหลว
- มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
- มีครรภ์หรือให้นมบุตร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อาการแทรกซ้อนที่ทางเดินอาหาร ได้แก่ ผู้ป่วย
สูงอายุ ผู้ป่วยซึ่งเคยมีประวัติของโรคทางเดินอาหาร
- ระวังการใช้หากท่านเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคหืด
ระดับทำงานบกพร่องรุนแรง
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายานี้ และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หรือสมุนไพร ที่กำลังกินอยู่ มีผลกับการใช้เอทอริคอก
สิบหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ
ชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาโดยทั่วไป กินวันละ 30-120 มิลลิกรัม ขึ้นอยู่
กับชนิดและความรุนแรงของโรค

วิธีใช้ยา

- รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างได้
- การใช้ยาควรเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
และขนาดยาต่อวันต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

ให้กินยาทันทีที่นึกได้แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอ
กินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง
เช่น ง่วงงุน ซึมเศร้า คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบปวดร้อน ให้
รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษารูปแบบประคับประคอง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ถ้าเวียนศีรษะ รู้สึกมึน หรือวุ่นงอนขณะ
รับประทานเอทอริคอกสิบ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถ
หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
- ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่า
เกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง
ตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดเค้นหัวใจ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ

รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อาการท้องอืด
อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องร่วง แสบยอดอก
- เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ความดันเลือดสูง อาการใจสั่น
นอนไม่หลับ ผื่น แผลเปื่อยในช่องปาก
- อาการบวม น้ำคั่งไม่บวมที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป
ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- หากเก็บยาในสภาวะที่ถูกต้อง ยานี้จะมีอายุ 3 ปี นับ
จากวันที่ผลิต
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559