

ฟลูออกซีทีน 20 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล [ข้อการค้า]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ฟลูออกซีทีน ไฮโดรคลอไรด์ (fluoxetine hydrochloride) เป็นยากลุ่มต้านซึมเศร้า

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า
- เพื่อรักษาอาการทางจิตประเภทย้ำคิดย้ำทำ
- เพื่อรักษาพฤติกรรมผิดปกติทางการกิน
- เพื่อรักษาอาการตื่นกลัวแบบเฉียบพลัน
- เพื่อรักษาอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจำเดือน

1.3 การปรับขนาดยาและหยุดยานี้ ต้องทำตามแพทย์สั่งเท่านั้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้
- ห้ามใช้ร่วมกับยาที่ยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดส (Monoamine oxidase inhibitor), ยาไพโมไซด์ (Pimozide) และยาไธโอริดาซีน (Thioridazine)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ต้องรับประทานยานี้ติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์จึงจะทำให้อาการซึมเศร้าดีขึ้น ถ้ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหลังจากกินยานี้ให้ แจ้งแพทย์ทันที
- ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - โรคลมชัก
 - โรคหัวใจ
 - โรคตับ
 - โรคอารมณ์สองขั้วหรือมีภาวะคึกคักเกินปกติ
 - โรคเบาหวาน
 - โรคต่อหีน
 - โรคกระดูกพรุน
 - ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ • ยาต้านซึมเศร้าอื่นๆ • ยากลุ่มทริปแทน • ยา lithium • ยาแก้ปวดทรมานอดอล • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด • ยาแก้ชักที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (เช่น เฟียรอกซิแคม โอบูโปรเฟน) • ยาต้านโรคจิต (เช่น ฮาโลเพริดอล โคลซาปีน) • ยารักษาโรคมะเร็งเต้านมทาม็อกซิเฟน • ยาขับปัสสาวะ • สมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ต • เครื่องดื่มที่ผสมเหล้า
- หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- หญิงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้หลังอาหาร
- ถ้ากินยารวันละ 1 ครั้ง ให้กินยาหลังอาหารมื้อเช้าเพื่อลดผลข้างเคียงของยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ไม่ต้องกินยามื้อนั้นให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากอาการแย่ลงหรือมีผลข้างเคียงจากยาที่ทนไม่ได้ให้แจ้งแพทย์
- ห้ามลดหรือหยุดกินยาเอง เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบหรือเกิดอาการขาดยาได้

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5.อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดปกติ
- ตัวแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก รู้สึกไม่สบายตัว อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ สับสน กระสับกระส่าย ฉุนเฉียว เห็นภาพหลอน สั่น ชัก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร ลื่นรับรสผิวดปกติ
- นอนไม่หลับ มึนงง ปวดหัว ง่วงซึม ผื่นร้าย
- ใจสั่น กล้ามเนื้อกระตุก เดินเซ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้นเช่นในรถห้องน้ำห้องครัว
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
18 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อหากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร