

อินโดเมทาซิน 25 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาวาอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าอินโดเมทาซิน (indomethacin) อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ และโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ในเด็ก
- เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดข้อ อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิและอาการที่เกี่ยวข้อง
- รักษาอาการอักเสบปวด บวม ภายหลังจากบาดเจ็บหรือหลังการผ่าตัด รวมถึงการทำฟัน
- รักษาโรคเก๊าต์แบบเฉียบพลัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือเคยแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับยานี้
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
- มีอาการปวดจากกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
- มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรคตับ โรคไต ขั้นรุนแรง
- เป็นสตรีมีครรภ์ในเดือนที่ 7-9
- มีปัญหาทางพันธุกรรมหายากเกี่ยวกับการแพ้น้ำตาลกาแลกโทส
- เป็นไข้เลือดออก หรือมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ การตีบตันของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ
- ยานี้ อาจทำให้เกิดอาการแพ้และปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง การล่อนออกเป็นแผ่นหรือเกล็ด กลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสัน หนึ่งกำพร้าหลุดลอก
- ยานี้ ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายา และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพร ที่กำลังกินอยู่ มีผลกับการใช้อินโดเมทาซินหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ผู้ใหญ่ ขนาดยาที่แนะนำ คือ 50 ถึง 200 มิลลิกรัม โดยการแบ่งให้ วันละ 2-3 ครั้ง
- เด็กอายุ 2ปี ขึ้นไป ถึง 14 ปี ขนาดยาที่แนะนำ คือ เริ่มต้นกินในขนาด 1- 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยการแบ่งให้ วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง (2 - 4 ครั้ง) และเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์จนได้ขนาดสูงสุดวันละ 3 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกิน 150 - 200 มิลลิกรัมต่อวัน

วิธีใช้ยา

- รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
- การใช้ยาควรเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขนาดยาต่อวันต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ง่วงงุน เชื่องซึม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบยอดอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษาแบบประคับประคอง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อย่างไร

ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่าเกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น
- หากมีอาการง่วงซึม มึนงง การมองเห็นผิดปกติในระหว่างใช้ยานี้ ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดเค้นหัวใจ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องร่วง อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาการท้องอืด
- เวียนหรือปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ ผื่น อาการบวม น้ำกัดไม่มุ่มที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559