

ลอร์ทาดีน 5 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
ชนิดน้ำเชื่อม

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**
- ลอร์ทาดีน (loratadine) จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้แพ้
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- บรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น
 - น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คัดน้ำ คัดจมูก จาม เยื่อตาอักเสบ ในโรคเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ หรือใช้ละอองฟาง
 - บรรเทาอาการทางผิวหนัง เช่น คัน ลมพิษเรื้อรัง และอาการแพ้ทางผิวหนังอื่น ๆ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้หรือเดสลอร์ทาดีน (desloratadine) หรือส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- **ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้** เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - โรคตับ โรคไต
 - โรคต่อหีน
 - โรคลมชัก
 - ต่อมลูกหมากโต บีสสวะขัดหรือบีสสวะคั่ง
 - เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
 - ผู้สูงอายุ

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
Control Version 00 : 20170105

- **แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้** หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์
 - กำลังให้นมบุตรเพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยานหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ยาด้านจุลชีพบางชนิด ยาด้านเชื้อราบางชนิด ยาด้านไวรัสเอดส์บางชนิด ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด ยานอนหลับหรือยาคลายกังวล ยาแก้แพ้ตัวอื่น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยานี้แล้วมีอาการง่วงซึม เวียนศีรษะ ตาพร่า ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ง่วงซึมมากขึ้น

- ถ้าต้องทำการทดสอบภูมิแพ้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- เหนื่อยหรืออ่อนเพลียรุนแรง
- หัวใจสั่น หรือหัวใจเต้นผิดปกติ
- ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ, คอตา หรือลิ้นได้

5.2 อาการที่ ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที เช่น

- ง่วงซึม
- ปากแห้ง
- ปวดศีรษะ
- หงุดหงิด
- ตาแดงหรือเคืองตา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 - แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
 - เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส รวมทั้งไม่นำไปแช่ตู้เย็นในช่องแช่แข็ง ไม่เก็บยาในที่ร้อนและชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
 - เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก
- ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย
-

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559