

**ลอราทาดีน 10 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้าภาษาไทย (อังกฤษ)**

1.ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ลอราทาดีน (loratadine) จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้แพ้ ที่ออกฤทธิ์นาน และอยู่ในกลุ่มไม่ทำให้ง่วง แต่ในบางรายอาจทำให้ง่วง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม น้ำมูกไหล คัดจมูก คัดตา แสบตา เนื่องจากโรคภูมิแพ้
- ยานี้ยังใช้สำหรับบรรเทาอาการของลมพิษเรื้อรัง และอาการแพ้ทางผิวหนังอื่นๆ

2.ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ลอราทาดีน
- เคยแพ้เดสลอราทาดีน (desloratadine) หรือ เคยแพ้ส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย (ระบุข้อความนี้กรณีที่ยามีส่วนผสมของแอสปาแตม)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- โรคตับ โรคไต และโรคหัวใจ
- สตรีมีครรภ์ระยะสามเดือนแรก
- สตรีให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้
- ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เมื่อใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือกลุ่มยาดังต่อไปนี้ เช่น
 - ยาด้านจุลชีพบางชนิด
 - ยาด้านเชื้อราบางชนิด
 - ยาด้านไวรัสเอดส์บางชนิด
 - ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด
 - ยานอนหลับหรือยาคลายกังวล
 - ยาแก้แพ้ตัวอื่น
 - ยาลดความดันโลหิตบางชนิด
 - ยาควินิดีน (quinidine)
 - ยาลดกรดไซเมทีดีน (cimetidine)

หมายเหตุ – ทั้งนี้แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ได้หากมี
เหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 12 ปี:
กิน 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และไม่ควรกินยาเพิ่มเอง

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากได้รับยาเกินขนาด อาจมีอาการง่วงนอน หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาลทันที

4.ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในขนาดยาที่แนะนำให้ใช้ อย่างไรก็ตาม ยานี้ทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือ งานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่ากินยานี้แล้วไม่ง่วง และไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์
- ถ้าต้องทำการทดสอบภูมิแพ้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้อยู่ ท่านควรหยุดยานี้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนทำการทดสอบ
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ ยาซิสซาไพเรด (cisapride)
- หากกินยานี้ต่อเนื่องกันเกิน 14 วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5.อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- เหนื่อยหรืออ่อนเพลียรุนแรง
- ใจสั่น หรือหัวใจเต้นผิดปกติ
- ชัก

(เว้นช่องไฟ 1 เคาะ)

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้อย่างรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที เช่น

- ง่วงซึม
- ปากแห้ง
- ปวดศีรษะ
- เวียนศีรษะ
- กระวนกระวาย
- คลื่นไส้
- กระเพาะอาหารอักเสบ
- ผมรั้ง

6.ควรเก็บยาน้อย่างไร

- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน ... (ปรับตามทะเบียน)... องศาเซลเซียส รวมทั้งไม่นำไปแช่ตู้เย็นในช่องแช่แข็ง ไม่เก็บยาในที่ร้อนและชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นสายตาและมือเด็ก
- เก็บยาไว้ในกล่องหรือแผง ตามที่ได้รับมา

ผู้ผลิต โทร.(กรณีผลิตในประเทศ) (ปรับตามทะเบียน)
ผู้นำเข้า โทร.(ปรับตามทะเบียน)
ผู้แทนจำหน่าย (ปรับตามทะเบียน)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2561