

มีเบนดาโซล 100 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร  
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาถ่ายพยาธิ มีชื่อสามัญว่า มีเบนดาโซล (mebendazole)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคพยาธิบางชนิดเช่นพยาธิเข็มหมุด พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ และพยาธิไส้เดือน

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
- กำลังตั้งครรภ์

#### 2.2 ข้อควรระวัง

- **ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ถ้ากำลังให้นมบุตร เป็นโรคตับ เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง**
- **อย่าใช้ยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ และอย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะยาอาจกดไขกระดูกทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำและติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย**
- **อย่าใช้ร่วมกับยาด้านแบคทีเรียชื่อเมโทรนิดาโซล (metronidazole) เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการแพ้**

ทางผิวหนังอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

- **อย่าใช้กับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจทำให้เด็กชกได้ (มีโอกาสดังกล่าวได้น้อย)**

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น**
- กินยานี้ได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร
- **ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดที่แพทย์สั่ง**
- **อย่ากินยานี้ในขนาดสูง หรือกินอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้**

#### 3.2 หากลืมหากินยา ควรทำอย่างไร

- หากลืมหากินยาครั้งที่ 2 ในอีก 2 สัปดาห์ให้กินยาทันทีที่นึกได้ ไม่ควรกินสัปดาห์ที่ 3 หลังจากกินครั้งแรก

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยอาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง หากมีอาการที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

12 พฤษภาคม 2559

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยา

- ไม่มีข้อควรปฏิบัติเป็นพิเศษ

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ค้น ผื่นแดง ผื่นหนังหลุดลอก ผม่ว่ง ตุ่มพองที่ผิวหนังร่วมกับเจ็บในปากและตา
- อาการไขกระดูกถูกกด เช่น ไข้หนาวสั่น เจ็บคอ ชัก เหนื่อย หรืออ่อนเพลียผิดปกติ

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องเสียปวดท้อง
- เวียนศีรษะปวดศีรษะ
- คลื่นไส้ อาเจียนเบื่ออาหาร

### 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสง โดยตรงโดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก